



## Evoluția bolii meningococice pe teritoriul României, 2018

În anul 2018, pe teritoriul României, au fost raportate 77 de cazuri suspecte de boală meningococică, din care s-au confirmat 73 (clinic și cu laboratorul).

Deși au existat suspiciuni pe tot parcursul anului, cele mai multe cazuri suspecte au fost raportate și confirmate în lunile ianuarie, aprilie, mai și martie așa cum se observă în graficul de mai jos.



Din cele 42 de județe, 24 au raportat cazuri suspecte de boală meningococică. Nu au fost raportate cazuri suspecte de boala meningococică în județele: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Caraș, Călărași, Galați, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Olt, Neamț, Sălaj, Suceava, Tulcea, Vâlcea și Ilfov.






## Caracteristici epidemiologice in evolutia cazurilor confirmate cu boală meningococică pe teritoriul României, 2018


Raportul pe sexe, masculin : feminin a fost de 2 : 1.

Distribuția cazurilor pe medii de rezidență a evidențiat o distribuție a cazurilor ușor în defavoarea mediului urban: mediul urban - 33 de cazuri (45,2%) și mediul rural – 40 cazuri (54.8%).

Distribuția cazurilor de boală meningococică pe grupe de vârstă, a evidențiat predominanța cazurilor la grupa de vârstă 0 - 4 ani: 28 cazuri (38,35%), urmată de grupele de vârstă: peste 65 de ani – 8 cazuri (11,11%), 5 - 9 ani – 6 cazuri (8,33%), 10 - 14 ani, 15 - 19 ani, 25 - 29 ani și 50 - 54 ani – câte 4 cazuri (5,56%).



68% din cazurile de boală meningococică au fost reprezentate de cazuri de meningită meningococică.



La 20 dintre cazurile confirmate cu laboratorul (32,2%) s-a determinat serotipul de meningococ: serotip A – 1 caz, serotip B – 16 cazuri, serotip C – 3 cazuri. Pentru 2 cazuri a fost exclus serotipul B (ACYW135)

Distribuția pe județe a serotipurilor de meningococ este prezentată în tabelul de mai jos:

	AG	BB	CT	CV	GR	GJ	HR	HD	IS	SB	MS	Total
Serotip ACYW135 (a fost exclus serotipul B)									2			2
Serotip A							1					1
Serotip B	2	2	1	1	1	1	2		3		3	16
Serotip C				1				1		1		3
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>22</b>

Forma de boală a fost severă în 49.3 % din cazuri și medie în 43,8%.

S-a înregistrat un număr de 16 decese prin boală meningococică, la cazuri severe, unele (6) depistate tardiv și care au decedat în primele ore de la internarea în serviciul de asistență medicală.

Cazurile de deces s-au înregistrat la grupele de vârstă 0-4 ani (9 cazuri), 15-19 ani (1 caz), 40-44 ani (1 caz), 50-54 ani (2 cazuri), 60-64 ani (1 caz), peste 65 de ani (2 cazuri).

#### Rata mortalității specifice pe grupe de vârstă prin boală meningococică

Grupa de vârstă	Rata mortalității specifice (%ooo loc.)
Sub 1 an	1.514983
1- 4 ani	0.776032
10-14 ani	0.093038
15-19 ani	0.065876
30-34 ani	0.192791
35-39 ani	0.073713
40-44 ani	0.129372
60-64 ani	0.115514

Rata mortalității prin boala meningococică în România a fost de 0,08%ooo locuitori, iar rata de fatalitate a fost de 22,22%.

71.23% din contactii cazurilor de boala meningococică (1419 contacti dintr-un total de 1992) au primit chimioprofilaxie.

