

Recomandari temporare pentru vaccinarea impotriva febrei galbene pentru calatorii in Brazilia

In data de 31.01.2017 OMS informeaza ca mai multe state din Brazilia care inainte nu erau considerate la risc pentru transmiterea febrei galbene, se confrunta cu o crestere semnificativa a activitatii febrei galbene incluzand cazuri la primate (maimute) si om asociate cu transmiterea virusului intre primate (maimute) si specii silvatice de tantari (transmitere silvatica). (<http://www.who.int/ith/updates/20170131/en/>)

Noile arii pentru care este recomandata calatorilor vaccinarea impotriva febrei galbene sunt:

• **Statul Bahia:** extinderea ariei de risc pentru transmiterea febrei galbene incluzand urmatoarele municipalitati din sudul si sud-vestul statului: Alcobasa; Belmonte; Canavieiras; Caravelas; Ilheus; Itacare; Mucuri; Nova Visosa; Porto Seguro; Prado; Santa Cruz Cabralia; Una; Urusuca; Almadina; Anage; Arataca; Barra do Chosa; Barro Preto; Belo Campo; Buerarema; Caatiba; Camacan; Candido Sales; Coaraci; CondeUba; Cordeiros; Encruzilhada; Eunapolis; Firmino Alves; Floresta Azul; Guaratinga; Ibicarai; Ibicui; Ibirapua; Itabela; Itabuna; Itagimirim; Itaju do Colonia; Itajupe; Itamaraju; Itambe; Itanhem; Itape; Itapebi; Itapetinga; Itapitanga; Itarantim; Itororo; Jucurusu; Jussari; Lajedao; Macarani; Maiquinique; Mascote; Medeiros Neto; Nova Canaa; Pau Brasil; Piripa; Planalto; Posoes; Potiragua; Ribeirao do Largo; Santa Cruz da Vitoria; Santa Luzia; São Jose da Vitoria; Teixeira de Freitas; Tremedal; Vereda; Vitoria da Conquista.

• **Statul Espírito Santo:** la risc pentru transmiterea febrei galbene cu exceptia zonei urbane Vitoria

• **Statul Rio de Janeiro:** la risc pentru transmiterea febrei galbene in urmatoarele municipalitati de la granita de nord cu statele Minas Gerais si Espírito Santo: Bom Jesus do Itabapoana; Cambuci; Cardoso Moreira; Italva; Itaperuna; Laje do Muriae; Miracema; Natividade; Porciuncula; Santo Antonio de Padua; São Fidelis; São Jose de Uba; Varre-Sai; Campos dos Goytacazes; São Francisco de Itabapoa; São João da Barra.

Determinarea acestor noi zone de risc de transmitere a febrei galbene este preliminară.

Actualizari vor fi facute regulat.

OMS recomanda calatorilor care merg in Brazilia in zone cu risc de transmitere a febrei galbene si in ariile de risc extinse, enumerate anterior, urmatoarele:

- Vaccinarea impotriva febrei galbene cu cel putin 10 zile inainte de calatorie: o singura doza de vaccin impotriva febrei galbene este suficienta sa asigure imunitate sustinuta si protectie de-a lungul intregii vieti impotriva febrei galbene
- Adoptarea de masuri de protectie impotriva muscaturilor de tantari
- Consultarea serviciilor medicale daca apar semne de imbolnavire in timpul sederii in zonele de risc pentru febra galbena sau la scurt timp dupa intoarcerea de acolo.