



## Evaluare rapida de risc (RAPID RISK ASSESSMENT)

### privind izbucnirea de legioneloza asociata calatoriei, din Palmanova, Mallorca, Spania, septembrie–octombrie 2017

23 octombrie 2017

O crestere a numarului de cazuri de legioneloza este raportata de calatori din EU care se intorc din Palmanova, Mallorca, Spania. Au fost raportate **18 cazuri**, din care unul a decedat, avand debutul intre 11 septembrie si 7 octombrie 2017.

**Sursa izbucnirii inca nu a fost identificata, dar se suspecteaza ca ar fi in comunitate.**

In absenta unei surse de Legionella identificata si aflata sub control, poate exista, in continuare, un risc de expunere la aceasta bacterie pentru persoanele care traiesc sau viziteaza aceasta localitate.

Urmatoarele **optiuni pentru masuri de control** ar trebui avute in vedere, ca raspuns la aceasta izbucnire:

- **Informarea calatorilor** – in mod particular a celor in varsta de peste 50 de ani, fumatori si imuno-compromisi – sa se adreseze medicului daca prezinta **manifestari respiratorii cu pana la 2 saptamani dupa calatoria in Palmanova, Mallorca**. Calatorii simptomatici ar trebui sa mentioneze acest istoric de calatorie.
- Calatorii care au stat in Palmanova dupa 10 octombrie 2017 ar trebui informati despre riscul de a se imbolnavi de legioneloza si sa li se recomande sa se adreseze medicului daca prezinta simptome de pneumonie.
- **Clinicienilor** trebuie sa li se aminteasca sa aiba in vedere legioneloza la pacientii cu **pneumonie** care au **istoric de calatorie** in zona amintita, in cele **2 saptamani anterioare debutului**.
- Statele Membre EU trebuie sa notifice toate cazurile de legioneloza asociata calatoriei in Palmanova (travel-associated Legionnaires' disease (TALD)) catre ELDSNet si care au stat intr-o unitate de cazare privata.

- Pentru a sprijini autoritatile spaniole, este necesara furnizarea de informatii catre rezidentii locali si calatorii in Palmanova, pentru a se asigura un diagnostic si tratament prompte, precum si cunoasterea tuturor cazurilor, in vederea stabilirii extinderii izbucnirii. **Este probabil sa fie identificate noi cazuri, avand in vedere perioada lunga de incubatie a legionelozei.**
- **Implementarea masurilor de control pentru instalatii** (ex.sisteme de aprovizionare cu apa), identificate ca surse de risc dupa investigatiile facute de autoritatile de sanatate publica, va minimiza riscul de aparitie de noi cazuri.

De moment ce legioneloza nu poate fi transmisa de la om la om, riscul pentru populatia EU ramane limitat la persoanele susceptibile care traiesc in sau viziteaza zona in care izbucnirea a fost detectata.

Sursa: ECDC

Tradus, adaptat:

Dr.Odette Popovici

