

**Scrisoare metodologica privind vaccinarea BCG,
citirea cicatricii vaccinale BCG si recuperarea restantierilor**

Actualizare 27.06.2017

1. Vaccinarea BCG se face la nou-nascut in maternitate, la varsta de 2-7 zile si este asigurata gratuit, in cadrul Programului National de Vaccinare (PNV).

Copilul HIV pozitiv nu se vaccineaza BCG, iar cel nascut din mama HIV pozitiva va fi testat HIV dupa 2 luni de la nastere si va putea fi vaccinat BCG doar in cazul unui rezultat negativ.

2. Citirea cicatricii vaccinale BCG nu se mai recomanda, avand in vedere ca unele tipuri de vaccin BCG nu lasa cicatrice, desi asigura protectie fata de formele severe de boala (miliara tb, meningita/meningo-encefalita tb).

3. Recuperarea la vaccinarea BCG se face astfel:

- in timp cat mai scurt, **FARA testare la tuberculina**, a copiilor nevaccinati la nastere, cu **varsta sub 3 luni**;
- in timp cat mai scurt, **CU testare la tuberculina**, a copiilor nevaccinati la nastere, cu **varsta de minimum 3 luni** si rezultat negativ la aceasta testare (0-9 mm pentru copiii fara infectie HIV), dar nu mai tarziu de varsta de **4 ani**.

4. Directia de Sanatate Publica Judeteana / a Mun.Bucuresti decide locul recuperarii la vaccinarea BCG:

- in *cabinetul medicului de familie*

sau

- in *dispensarul de pneumoftiziologie* pendinte de spitalul cu care DSP are contract pentru aceasta vaccinare, intr-un cabinet dedicat sau cu separarea circuitelor functionale in timp.

In cazul in care, la chestionarea parintilor/apartinatorilor privind existenta unui caz de tuberculoza in familie, raspunsul este pozitiv, copilul va fi indrumat mai intai, pentru evaluare, la dispensarul de pneumoftiziologie.